


واحد آموزش کنترل عفونت بیمارستانی	هوالشافی	 دارای گواهینامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در مدیریت کیفیت و درجه یک عالی ارزشیابی
	تراکت آموزشی با موضوع : دستورالعمل پیشگیری از آسپراسیون بیماران در بخش ICU	

تاریخ بازنگری: ۹۳/۰۹/۲۵

شماره بازنگری: ۲

شماره سند: ۷۵۳۰-ف

پیشگیری از پنومونی ناشی از آسپراسیون در بخش ICU

از انجائیکه شایع ترین علت عفونت در ICU پنومونی ناشی از آسپراسیون می باشد اقدامات زیر در پیشگیری از آن ضروری است .

- هر چه زودتر لوله نازوگاستریک و لوله تراشه را درآورید.
- مریض را در وضعیت نیمه نشسته یا در وضعیت خوابیده به پهلو قرار دهید.
- از اتساع (دیستانسیون) معده جلوگیری به عمل آورید.
- در لوله گذاری به جای بینی از دهان استفاده کنید.
- ناحیه زیر گلو را مرتب ساکشن کنید.
- مایع و ترشحات بالای حلقه لوله تراشه را درناژ کنید.
- از انتقال غیرضروری بیمار و لوله گذاری غیر ضروری بپرهیزید.
- از به کار بردن غیرضروری مسکن ها اجتناب کنید.
- دستگاه تنفس مصنوعی را باید هر ۷ روز یکبار تعویض نمائید .

تنظیم و هماهنگی: سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر کنترل عفونت

منبع: راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی