

## درمان

استفاده از شکل تزریقی دارو به صورت موضعی و سیستمیک. در روش موضعی دارو در چهار نقطه داخل زخم تزریق می گردد. داروهای خوراکی نیز وجود دارد.

## مخزن بیماری

### • در کانونهای لیشمانیوز پوستی نوع شهری یا

خشک سگها نیز مانند انسان به این انگل آلوده و به نظر می رسد مخزن اصلی بیماری هستند.

### • در لیشمانیوز پوستی نوع روستایی یا مرطوب

مخزن بیماری عمدتاً جوندگان بوده که مهمترین آنان در ایران موش صحرائی می باشد.



## راه انتقال بیماری

مهمترین راه انتقال بیماری از طریق گزش پشه خاکی است که محدوده پرواز آن کم است و در مکانهای تاریک و مرطوب به خصوص در ابتدای لانههای موشها استراحت می کنند و همچنین در بیابانها و جنگلهای بارانی یافت می شوند. پشه خاکی نیمه اهلی اطراف شهرها و در زیرسنگها و نخالههای ساختمانی زندگی می کند. طول هر پرواز حداکثر ۱ متر و حداکثر تا چند صد متری محل تولید می باشد.



عامل بیماری تک یاخته ای از جنس لیشمانیا می باشد و بیماری قابل انتقال بین انسان و تعدادی از حیوانات از جمله جوندگان و سگ است که توسط پشه خاکی از فرد بیمار، به دیگران انتقال می یابد. این بیماری بویژه در فصول گرم سال و در مناطق گرمسیر کشور، بیشتر مشاهده می شود. این بیماری در آغاز به صورت یک برجستگی کوچک (پاپول) است که به تدریج بزرگ شده و به صورت زخم درمی آید احتمال دارد که زخم ها خود به خود ظرف چند هفته تا چند ماه و گاهی یکسال و یا بیشتر بهبود یابند. در برخی افراد عود بیماری پس از بهبود به صورت زخم و یا برجستگی کوچک در محل زخم قبلی بهبود یافته ظاهر می شود.

## انواع

- روستایی (مرطوب) و شهری (خشک).
- جلدی و احشایی (کالآزار).

## روشهای پیشگیری از بیماری سالک

### • حذف عوامل مساعد کننده

- بهسازی و ترمیم شکاف دیوارها در مناطق مسکونی و نگهداری دام و طیور
- بهسازی کانالهای روباز، دفع صحیح فاضلاب و تفاله های ساختمانی
- جمع آوری و دفع صحیح فاضلاب و نخاله های ساختمانی
- اتلاف سگهای ولگرد و مبارزه با جوندگان
- تخریب و تسطیح اماکن مخروبه و متروکه
- **محافظت در برابر نیش پشه**



- نصب توری ریز بر روی پنجره ها و دربهای ورودی
- استفاده از پشه بند معمولی و ترجیحا آغشته به حشره کش که برای مدت طولانی اثر آن باقی می ماند.

- استفاده از پمادها و مواد دور کننده حشرات هنگام استراحت و خواب در مناطق آلوده
- پوشاندن زخمهای سالکی به منظور جلوگیری از آلوده شدن پشه خاکی های جدید و انتشار بیماری به دیگران.

### • سمپاشی

- فقط در نوع شهری می توان در کنار دیگر اقدامات بهسازی و پیشگیری در شرایط خاص گاهی از این روش استفاده نمود.
- معمولا سمپاشی موجب مهاجرت پشه ها به مناطق مجاور و پیدا شدن انواع مقاوم ناقل می شود و بهترین راه برای از بین بردن رشد و تکثیر پشه خاکی بهسازی محیط است.

### منابع

۱. بیماری سالک (لیشمانیوز جلدی) و اهمیت آن. انسیتو پاستور ایران. ۱۳۹۰.
۲. لیشمانیوز \_ انواع ، علائم ، عوارض ، پیشگیری ، درمان . سایت پزشکان بدون مرز. ۱۳۸۷.



داری گواهنامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱  
در مدیریت کیفیت و  
درجه يك عالی ارزشیابی

دفتر بهبود کیفیت  
و اعتبار بخشی

هوالشافی

عنوان سند:  
بمفlet آموزشی

شماره سند: ۷۵۳۰ ف شماره بازنگری: ۲ تاریخ بازنگری: ۱۳۹۳/۱۰/۱۸

# سالک

## Leishmaniasis

تنظیم و هماهنگی:

سوپروایزر آموزشی

تهیه کننده:

مریم غلام ناوی (واحد آموزش)

دکتر رضا بلند نظر متخصص بیماریهای عفونی

آدرس: خیابان شهید مفتح ، خیابان وحید ۳

تلفن: ۲۷۸۷۰۰۱